



# Romeo®

## ELICITOR APLICACIÓN FOLIAR

Composición	%p/p
Cerevisane®	94.1 %

\*Cerevisane: Pared celular de la levadura *Saccharomyces cerevisiae*

**Uso:** Elicitor (Inductor de resistencia contra enfermedades)

**Formulador:** Agrauxine - Francia

**Registro AGROCALIDAD:** F-2024-1682

---

**ROMEO** es un elicitor (inductor de resistencia sistémica en forma preventiva contra enfermedades) que contiene el ingrediente activo Cerevisane. La sustancia activa es la pared celular de la levadura *Saccharomyces cerevisiae*. Cerevisane induce la resistencia interna de la planta en forma preventiva contra las principales enfermedades foliares. Tras la aplicación, la planta mantendrá activas las defensas de la planta con una persistencia de 7 días, debiendo repetir el tratamiento tras ese periodo.

---

### PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

**Estado físico:** Sólido (polvo mojable)

**Color:** Beige

**Olor:** Característico a levadura

**Densidad:** 0.65 g/ml

**pH:** 3,2 a 21°C al 1% p/v

**Solubilidad:** Dispersable en agua

---

### MODO DE EMPLEO

ROMEO es un elicitor en formulación de polvo mojable, de aplicación foliar. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. Se recomienda usar el equipo de protección personal durante la aplicación. Corregir el pH del agua a 5.5 y la dureza menor a 70 ppm.

## CUADRO DE DOSIS

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Ornamentales	0.20 – 0.25 g/L	Aplicar en cultivo establecido, en cualquier momento del ciclo productivo de la planta, con 7 días de intervalo entre aplicaciones.	Aplicación foliar, con un gasto de agua de 1000 a 1200 l/ha, de manera continua y uniforme, mojando toda el área foliar
Tomate ( <i>Solanum lycopersicum</i> )	500 - 750 g/ha	Aplicar en cultivo establecido, en cualquier momento del ciclo productivo de la planta, con 7 días de intervalo entre aplicaciones.	Aplicación foliar, con un gasto de agua de 200 a 400 l/ha, de manera continua y uniforme, mojando toda el área foliar.
Cucurbitáceas	500 g/ha	Aplicar en cultivo establecido, en cualquier momento del ciclo productivo de la planta, con 7 días de intervalo entre aplicaciones.	Aplicación foliar, con un gasto de agua de 300 l/ha, de manera continua y uniforme, mojando toda el área foliar.
Arándano azul ( <i>Vaccinium spp.</i> )	250 - 500 g/ha	Aplicar en cultivo establecido, en cualquier momento del ciclo productivo de la planta, con 7 días de intervalo entre aplicaciones.	Aplicación foliar, con un gasto de agua de 500 a 1000 l/ha, de manera continua y uniforme, mojando toda el área foliar.

La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.

---

## COMPATIBILIDAD

Evite la mezcla de ROMEO con productos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad y sobre el cultivo en un área pequeña.

---

## PRECAUCIONES DE MANEJO Y USO

- No coma, beba o fume durante las aplicaciones;
- Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir producto durante la aspersión, usar traje protector, guantes de caucho, máscara y lentes protectores;



- Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con el producto; lávela con agua y jabón después de cada uso.
- Lávese bien las partes contaminadas con agua y jabón después de la aplicación

**TITULAR DEL REGISTRO:**



**SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA**

**Dirección:** Av. Pampite s/n y pasaje Darío Donoso, Edificio Offcenter, Oficina No. 315, Cumbayá, Quito – Ecuador

**Teléfono:** (593)2500 0134 <http://summitagroecuador.com/>